

USO DELLE DERIVATE SUCCESSIVE

Teorema Sia $y = f(x)$ una funzione derivabile almeno due volte in (a, b) e sia $x_0 \in (a, b)$ allora se la derivata seconda è continua in (a, b) e

$$f'(x_0) = 0, \quad f''(x_0) > 0 \quad \text{oppure}$$



$$[f'(x_0) = 0, \quad f''(x_0) < 0]$$

allora il punto $(x_0; f(x_0))$ è un punto di MINIMO [MASSIMO] locale.

Dim

Supponiamo $f'(x_0) = 0$ e $f''(x_0) > 0$.
Siccome $f''(x)$ è continua allora $\lim_{x \rightarrow x_0} f''(x) = f''(x_0)$.

Per il Teorema della permanenza del segno $\exists I_{x_0}$ in cui $f''(x) > 0 \Rightarrow$ la funzione $f'(x)$ è crescente e siccome, per ipotesi $f'(x_0) = 0 \Rightarrow f'$ sarà negativa prima di x_0 e positiva dopo x_0 . Allora x_0 sarà un punto di MINIMO locale per f .



ESEMPIO

$$f(x) = x^3 - 12x$$

$$- C.E.f = \{x \in \mathbb{R}\} = (-\infty; +\infty)$$

- segno

$$x(x^2 - 12) > 0 \begin{cases} \rightarrow x > 0 \\ \rightarrow x < -2\sqrt{3} \cup x > 2\sqrt{3} \end{cases}$$

- zeri e int. con assi

$$\begin{aligned} x=0 & \quad y=0 \quad O(0;0) \\ x=-2\sqrt{3} & \quad y=0 \quad A(-2\sqrt{3};0) \\ x=2\sqrt{3} & \quad y=0 \quad B(2\sqrt{3};0) \end{aligned}$$

- limiti e asintoti

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

- simmetrie

$$f(x) = x^3 - 12x \quad f(-x) = (-x)^3 - 12(-x) = -x^3 + 12x = -f(x) = x^3 - 12x$$

$$f(x) = -f(-x) \quad \text{FUNZIONE DISPARI}$$


- studio derivata prima

$$f(x) = x^3 - 12x \quad f'(x) = 3x^2 - 12$$

$$f'(x) \geq 0 \quad 3(x^2 - 4) \geq 0$$

$$N(2; -16) \quad \text{minimo}$$


$$M(-2; 16) \quad \text{massimo}$$



- studio derivata seconda

$$f''(x) = 6x \quad f''(x) \geq 0 \quad 6x \geq 0$$

$$O(0;0)$$



A, O, B zeri di $f(x)$
 M massimo
 N minimo
 O flesso a Tg orizzontale

3/3

